



MUDr. Viktorie Matvejko

Zlomenina bérce a popálenina vařící vodou.

Dvě kazuistiky z vlastní praxi:

1. Léčba zlomeniny bérce u 8- letého kluka

8- letý kluk, uraz při lyžování – klasická rotační zavřená zlomenina stření třetiny diafýzy tibie a fibuly. Na RTG – mírná dislokace, sádrová langeta s kontrolou za 3 dny k řešení dalšího postupu. Klinicky velký otok, zarudnutí celé DK bolest VAS 7-8/10, v den úrazu na ortopedické ambulaci inj. Tramal. Nasázená homeopatická léčba do koktejlu do pitného režimu: Arnica Montana 9ch, Calcarea carbonica 9ch, Calcarea fluorica 9ch, Calcarea phosphorica 9ch, symphytum 15ch, Silicea 15ch, Apis mellifica 15ch, Belladonna 9ch. Z celkové medikaci Vitamin D 4000ME + Vápník 1000mg. Kontrola za 3 dny – obraz už bez dislokace fragmentů, ke konzervativní léčbě – sádrová fixace do horní části stehna na 14 týdnů. Za 5 dni úprava koktejlu na Arnica Montana 9ch, Calcarea carbonica 9ch, Calcarea fluorica 9ch, Calcarea phosphorica 9ch, symphytum 15ch, Silicea 15ch. Nadále bez Vitaminu D a Ca. Kontroly na ortopedii 2x týdně kvůli velké aktivity dítěte s pravidelným poškozením sádrové fixaci. Dosažení plného zhojení za 7 týdnů, EX sádrové fixaci. Rehabilitace rychlá, bez komplikaci.

2. Léčba popáleniny obou DK 2. stupně u dospělého

Popálenina vařící vodou obou DK při spadnutí varné konvici – předního povrchu stehna – cca 18 % kožního povrchu 2. stupeň. Rychle provedení chlazení studenou sprchou. Po 5 minutách aplikace Dapis gel, Homeopatický koktejl Phosphorus 15ch, Apis mellifica 15ch, Belladonna 9ch do pitného režimu non stop. Do 2 hodin odeznění bolesti a pocitu pálení, po 12 hodinách – stopy popálení nejsou.